

בחינת העדפות הצוות בבית חולים למתן חיסון נגד COVID-19 למטופלים עם או בלי מחלת אלצהיימר

ד"ר נסרה אדלבי¹, RN, Mph, PhD², ד"ר חנאן אבו ג'בל³, BA, MA, PhD³, פרופסור פרלה ורנר³, BA, PhD

¹המרכז הרפואי לגיל, ²מכללת עמק יזרעאל, החוג לסיעוד, ³אוניברסיטת חיפה

תרשים

Table 1.

Correlates of participants' preferences for who should receive the COVID-19 vaccination first (%) (n=278)

Correlates	Moses	Samuel
Sociodemographic characteristics		
Gender		
Male	55.1	44.9
Female	56.7	43.3
Education*		
Less than 17 years	64.8	35.2
17+ years	48.8	51.2
Marital status		
Married	59.5	40.5
Single	44.8	55.2
Profession*		
Physician	42.3	57.7
Other ¹	59.9	40.1
Professional experience		
< 10 years	56.7	43.3
≥ 10 years	56.6	43.4
Working with people with dementia		
< 2 years	54.3	45.7
≥ 2 years	57.9	42.1
Morality justification		
Low	58.6	41.1
High	52.9	47.1
AD variables		
Susceptibility		
Low	58.9	41.1
Medium + High	54.1	45.9
Fear of getting AD		
Low	53.8	46.3
Medium+High	56.3	43.7
Subjective knowledge		
Low + Medium	57.7	42.3
High	55.1	44.9
Familiarity		
No	58.5	41.5
Yes	53.6	46.4
Social distancing		
Low	57.9	42.1
High	54.0	46.0
Negative emotions		
Low	55.3	44.7
High	57.3	42.7
Positive emotions		
Low	50.5	49.5
High	59.4	40.6
COVID-19 variables		
Susceptibility		
Low	35.0	65.0
Medium+High	57.0	43.0
Fear of becoming ill*		
Low	47.7	52.3
Medium+High	61.0	39.0

Moses - 55 years old with a diagnosis of AD; Samuel - 80 years old, cognitively intact

¹Nurses, occupational therapists, physiotherapists, paramedic

*p<.05

רקע

אין ספק שאנשים עם דמנציה יכולים להפיק תועלת רבה מהחיסון נגד COVID-19, מכיוון שהם נמצאים בסיכון מוגבר לפתח סיבוכים חמורים, כולל אשפוזים ארוכים ושיעורי תמותה גבוהים, כתוצאה מהיותם נגועים בנגיף. עם זאת, הם עשויים להזדקק לעידוד של אנשי מקצוע בתחום הבריאות להתחסן. העדפות אנשי המקצוע בנוגע לחיסון לקבוצה זו חשובות, לפיכך, להגברת השימוש באמצעי מניעה זה.

מטרות

1. לבחון את העדפות אנשי צוות בית החולים לחיסון נגד COVID-19 לאנשים עם או בלי מחלת אלצהיימר תוך הבחנה בין צעיר לבין אדם זקן עם המחלה.
2. לבחון את הגורמים הקשורים להעדפות אלו

שיטות

סוג המחקר:

מחקר חתך רוחבי

אוכלוסיית המחקר:

מדגם נוחות של אנשי מקצוע בתחום הבריאות, (רופאים, אחיות ופרא רפואי), במרכז רפואי אחד בצפון הארץ.

כלי המחקר:


שאלון שבו התבקש הצוות לדרג את העדפתו למתן חיסון נגד COVID-19 לשלושה חולי COVID-19, אחד בן 80 ללא מחלה קוגניטיבית, אחד בן 50 עם מחלת אלצהיימר (AD) ואחד בן 80 עם AD. בנוסף לשאלון שיפוט מוסרי, רגשות כלפי חולי אלצהיימר ושאלון פחד וסיכון להידבק בניגף הקורונה.

סיכום ומסקנות

הצוות הרפואי והסיעודי מתקשה להחליט אם הגיל או המצב הקוגניטיבי צריכים להיות הגורם המכריע למתן חיסון למטופל. קביעת מדיניות בנושא תסייע לאנשי המקצוע בהחלטות אלה.

טבלה

Participants' preferences for who should receive the COVID-19 vaccination first/last (n=278)



Moses- 55 years old with a diagnosis of AD
Jacob- 80 years old with a diagnosis of AD
Samuel- 80 years old, cognitively intact

תוצאות

במחקר השתתפו 278 אנשי צוות (22% צוות רפואי, 73% צוות סיעודי והשאר פרא רפואי). מרבית הנשאלים (75%) בחרו בחולה עם מחלת אלצהיימר בן ה-80 כהעדפה אחרונה לקבל את החיסון, אך היו חלוקים באופן שווה לגבי דרוג שני החולים האחרים. דת ותפיסת הסיכון להידבק בנגיף הקורונה היו הגורמים העיקריים שנמצאו באופן מובהק סטטיסטית כקשורים להעדפות המשתתפים.

מקורות

1. Holton S, Wynter K, Trueman M, et al. Psychological well-being of Australian hospital clinical staff during the COVID-19 pandemic. Aust Health Rev. 2020 <https://doi.org/10.1071/AH20203>
2. Morrow M, Pietro Vigezzi G, Capraro M, et al. 2019-novel coronavirus survey: knowledge and attitudes of hospital staff of a large Italian teaching hospital. Acta Biomed. 2020;91(3-S):29-34. doi: 10.23750/abm.v91i3-S.9419.