



המרכז הרפואי לגליל
רשות אקדמאית ומעמיקה



סדר פעולות במצב חירום!

בדוק הכרה על ידי גירויי משמעותיים בכף הרגל
בדוק נשימה בהסתכוות על בית חזה



במידה והילד אינו מגיב (מחוסר הכרה) ו/או לא מגיב



קרא לעזרה 101


התחל ב מיידי בעיסוי לב 30 פעמיים



פתח נתיב אווריר



בצע 2 נשימות



המשך בעיסוי לב 30 פעמיים



* המשך בפעולות החיה עד הגיעו עזרה רפואיית



המרכז הרפואי לגליל
ולפנות אקדמית ומחקר




גוף זר בתינוק ובילד

במידה והתינוק / ילד בהכרה ומראה סימני חנק: שיעול או ניסיון שיעול, קושי בנשימה, כחלון וקושי בדיבור.
בצע את הפעולות הבאות:

תינוק עד גיל שנה

1. השכבר את התינוק על האמה שלך עם הפנים כלפי מטה (יש לתמוך את הראש) ובצע 5 טפיחות חזקות בין השכבות (תמונה 1).
2. לאחר 5 טפיחות, הפוך את הילד ובצע 5 לחיצות חזקות על מרכז בית החזה בעזרת 2 אצבעות (תמונה 2).
3. חוזור על הפעולות (2-1) עד יציאת הגוף הזר.
4. במידה והתינוק מאבד הכרה יש לבצע הנשימות ולהתחליל בהחיה.



ילד מעל גיל שנה

1. הקף את גופו של הילד בעזרת שתי ידייך.
2. צור אגרוף בידייך החזקה כאשר גב האוגודל בולט כלפי בטן עליונה והיד תמוקם בנקודת שבין עצם החזה לפופיק (מרכז הבطن).
3. ידך השנייה תונח על היד המאוגנת. כעת בצע לחיצות פנימה ומעלה בחוזקה.
4. יש חוזור על לחיצות אלו עד ליציאת הגוף הזר.
5. במידה והתינוק מאבד הכרה יש לבצע הנשימות ולהתחליל בהחיה.