

הגינה שמיעתית

גורמים לירידה בשמיעה והיגינה שמעתית:




- שעוות אוזניים:
הצטברות שעווה בתעלת האוזן החיצונית cerumen מתרכזת בתעלת האוזן החיצונית, יכולה להיות בכניסה לתעלה או בסוף התעלה, ויכולה להיות קשה, רכה או דחוסה. סימפטומים:

- ירידה בשמיעה הולכתית בין 40-50 דציבל.
- יכולה לגרום לכאב
- טינטון וצלצולים באוזניים
- שיעול
- סחרחורת
- ריח רע ו/או הפרשה מתעלת האוזן
- יש לעבור בדיקה תקופתית אצל רופא א.א.ג.

- נוזלים באוזניים:

לרוב ילדים, אבל גם מבוגרים סובלים מזה. שכיחות מאוד בילדים בגילאי 2-4 שנים וזה בגלל שתעלת האוזן האוורור, אוסטאכיוס (שמתחברת בין האוזן והלוע) בילודים היא גם שטוחה וגם קצרה ובעצם מביאה חיידקים מכל האיזור הקדמי (האף והלוע) וזה יכול לגרום לדלקות ונוזלים



יש לעבור בדיקה תקופתית אצל רופא א.א.ג.



- חשיפה לרעש:

- חשיפה לרעש יכולה להתרחש בתעסוקה, בסביבת החיים היום יומיים וכן בפנאי.
- מגורים ליד איזור תעשייה, עבודות תשתית, בסיסים צבאיים ושדות תעופה
- תעשייה כבדה, מפעלים מטווח.
- אוזניות אישיות, הופעות, מסיבות ופאבים וחתונות.
- חשיפה לעוצמות האזנה גבוהות לאורך זמן מהווה גורם סיכון לירידה בשמיעה. משתמשים במיגון אוזניים כמו אטמים ואוזניות.



- חדירת גוף זר לאוזן:

- עשויה לגרום לפצע בתעלת האוזן, פגיעה בעור התוף או נזק חמור יותר באוזן התכונה ובאוזן הפנימית.
- פונים לרופא א.א.ג.

- ירידה בשמיעה עם העלייה בגיל
- פונים לשיקום שמיעה