

תבחין מנטו (Mantoux test)

מהו תבחין מנטו?

זוהי בדיקה עורית הבודקת תגובה אימונולוגית קודמת לחיידקי השחפת. מבוצע החל מגיל 6 חודשים והלאה.

אופן ביצוע הבדיקה:

התבחין נעשה בשני שלבים, כל שלב מחייב הגעה פעמיים, כלומר סה"כ 4 פעמים.

שלב ראשון

1. הזרקת חומר הבדיקה ביד שמאל, בהזרקה תת עורית.
2. הגעה לקריאת מנטו לאחר 48-72 שעות מההזרקה. במפגש זה מודדים את גודל התגובה.

שלב שני

1. הזרקה חומר הבדיקה ביד ימין, בהזרקה תת עורית (יבוצע כשבועיים עד 6 שבועות מהשלב הראשון).
2. הגעה לקריאת המנטו לאחר 48-72 שעות מההזרקה. במפגש זה מודדים את גודל התגובה.

עבור כל שלב בנפרד יש להביא התחייבות / תשלום עבור הבדיקה.

תופעות לוואי מקומיות נדירות:

אדמומיות, נפיחות, קילוף, פריחה או גרד בעור.

הבדיקה נערכת במכון ריאות בבניין מרפאות חוץ, קומה 2.

חשוב!!

במידה ובוצע חיסון חי מוחלש, MMR MMRV (חזרת, חצבת, אדמת), אבעבועות רוח, פוליו פומי וקדחת צהובה - יש לדחות את ביצוע תבחין המנטו ב- 4 שבועות לפחות לאחר החיסון.